

## آمادگی قبل از بالون لاغری معده

- جهت پاک بودن سطح داخلی معده، حداقل از ۸ ساعت قبل از آندوسکوپی، بیمار NPO باشد.
- در صورتی که مددجو دارویی را به طور مداوم مصرف می کند (مانند آنتی کوآگولانت ها و داروهای قلبی ، فشار خون، دیابتی) ، حتماً پزشک و پرستار را در جریان بگذارد.
- در صورتی که بیماری قلبی – عروقی یا فشار خون بالا دارد با پزشک مشورت نماید.
- اگر قبلاً دچار شکستگی بینی شده است یا پولیت بینی دارد، پزشک را مطلع نماید.
- در صورتی که مددجو سن بالای ۷۰ سال دارد قبل از اسکوپیی توسط پزشک بیهوشی مشاوره بیهوشی انجام شود.
- IV-LINE روی دست راست داشته باشد و سرم NS به صورت KVO در جریان باشد.
- داشتن آزمایشات کامل روتین طبق نظر پزشک.
- در بعضی موارد طبق نظر پزشک داشتن سونوگرافی شکم و CXR و ECG الزامی می باشد.
- آمادگی فکری و روانی جهت انجام این اقدام ضروری است .
- در صورت داشتن و یا سابقه عمل جراحی قلبی معده – اعتیاد به الکل یا داروهای روان گردان – وجود زخم معده یا اثنی عشر – ابتلا به بیماری های کلاژن واسکولار – بیماری های التهابی روده – سیروز کبدی – نارسایی کلیوی – فتخ هیپاتال بیش از ۵ سانتی متر و باردار بودن حتماً به پزشک و پرستار اطلاع داده شود.