

آمادگی قبل از ERCP

- جهت پاک بودن سطح داخلی معده، حداقل از ۸ ساعت قبل از آندوسکوپی، بیمار NPO باشد.
- در صورتی که بیمار دارویی را به طور مداوم مصرف می کند (مانند آنتی کوآگولانت ها و داروهای قلبی، فشار خون، دیابتی)، حتماً پزشک و پرستار را در جریان بگذارد.
- در صورتی که بیماری قلبی - عروقی یا فشار خون بالا دارد با پزشک مشورت نماید.
- اگر قبلاً دچار شکستگی بینی شده است یا پولیت بینی دارد، پزشک را مطلع نماید.
- پرستار باید از بیمار در مورد تماس قلبی با اشعه ایکس و هر نوع حساسیت و آلرژی و بارداری سوال کند.
- در افراد بالاتر از چهل سال نوار قلب به عمل آورد؛ در صورت لزوم مشاوره قلب و بیهوشی به منظور تایید اقدام به ERCP، انجام شود.
- در مواردی که سابقه ناراحتی ریوی وجود داشته باشد، مشاوره ریه ضروری است.
- بررسی از نظر اختلالات انعقادی (شمارش پلاکتی PTT (Partial Thromboplastin Time) و PT (Prothrombin Time) انجام و در صورت مختل بودن انعقاد به پزشک مربوطه اطلاع داده شود.
- IV-LINE روی دست چپ داشته باشد و سرم N/S به صورت KVO در جریان باشد.
- در صورتی که بیمار باردار می باشد، حتماً باید به پزشک اطلاع داده شود.
- نیم ساعت قبل از انتقال به بخش ERCP آمپول سفتریاکسون (ا گرم) انفوزیون شود.